



Great Ormond Street Çocuk Hastanesi NHS Tröstü: Aileler İçin Bilgiler

Vinkristin

Lütfen bu broşürü, varsa imalatçı firmanın sunduğu başka broşürlerle birlikte okuyun. Ancak, lütfen bu bilgi broşürünün Vinkristin'in çocuklar ve gençlere yönelik kullanımını izah ettiğine, bu nedenle imalatçı firmanın bilgilerine göre farklılık gösterebileceğine dikkat edin.

Bu bilgi broşürü Vinkristin'in ne olduğunu, nasıl verildiğini ve bazı muhtemel yan etkilerini açıklamaktadır. Her insanın ilaçlara tepkisi farklı olur, dolayısıyla bahsedilen yan etkiler çocuğunuzda ille de çıkmaz. Sorularınız veya kaygılarınız olursa, lütfen doktorunuz, hemşireniz veya eczacınızla konuşun.

Vinkristin nedir?

Vinkristin lösemi (kan kanseri) ve bazı katı tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Başka hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

Nasıl verilir?

Bir kanül (sonda), sentral venöz kateter veya vücuda yerleştirilen bir giriş aracıyla (implante port) yavaş yavaş damara enjekte edilir (intravenöz veya IV).



Yan etkileri nelerdir?

Kabızlık

Çocuğunuz kabız olabilir. Genellikle, bol miktarda sıvı alıp, fazla lifli yemekler yemek bu konuda yardımcı olabilir. Bazen doktorlar çocuğunuzun bağırsaklarını harekete geçirici ilaçlar yazabilir.

Uyuşma, karıncalanma veya ağrı ve acılar

Bu, Vinkristin'in çocuğunuzun sinir sistemine etkisinden dolayı olabilir. Çocuğunuz bacaklarında ağrı ve acılar olduğundan yakınabilir. Çocuğunuzun ağrı ve acıları olursa, lütfen doktor veya hemşirenize danışın. Çocuğunuz yürümekte herhangi bir şekilde güçlük çekerse, örneğin parmak uclarında yürürse, ayaklarını çarparsa veya denge sorunları olursa, lütfen doktora söyleyin. Çocuğunuzun bir fizyoterapistle görünmesi gerekebilir. Sonraki Vinkristin dozları azaltılabilir. Bu yan etkiler geçici olup, genellikle tedavi bittikten sonra geçer. Bazı küçük çocuklar Vinkristin alırken, göz kapakları sarkabilir. Bu da sinir sistemine etkisinden dolayıdır.

Çene ağrısı

Bazen, Vinkristin çene ağrısı veya yutma zorluklarına yol açabilir. Bu, Vinkristin'in yüzün yan tarafından aşağı inen kafatası sinirine etkisinden dolayı olur.



Bu yan etkiler geçici olup, genellikle tedavi bittikten sonra derece derece geçer. Çocuğunuzun çenesi ağrırsa, lütfen doktor veya hemşirenize danışın.

Saç kaybı

Çocuğunuz saçının bir kısmını ya da tümünü kaybedebilir, ya da saçı seyrelebilir. Bu geçici olup, tedavi bitince saç tekrar çıkacaktır.

İdrar yapma veya idrar tutmada rahatsızlık

Çocuğunuz idrar yaparken veya idrar çıkarırken acı veya rahatsızlık duyabilir. Böyle olursa, lütfen doktor veya hemşireye söyleyin.

Başka ilaçlarla etkileşim

Bazı ilaçlar Vinkristin'e reaksiyon gösterir, bu durum işleyişini etkiler. Çocuğunuza başka bir ilaç vermeden önce, her zaman doktor veya eczacınıza danışın; aile doktorunuzun (GP) yazdığı ilaçlar, eczaneden alınan ilaçlar veya bütün bitkisel veya tamamlayıcı (komplemanter) ilaçlar buna dahildir.

Bilmeniz gereken önemli bilgiler

- Vinkristin çocuğunuzun derisinin altına sızarsa, o bölgedeki dokulara zarar verebilir.
- Eğer bu ilaç kanül ile verilirse ve çocuğunuz kanül etrafında karıncalanma veya yanmadan yakınırsa, lütfen derhal doktor veya hemşirenize söyleyin.

Eğer bu ilaç bir sentral venöz kateteri veya vücuda yerleştirilen giriş aracıyla veriliyorsa ve çocuğunuz göğüs veya boyun kısmında ağrıdan yakınıyorsa, lütfen derhal doktor veya hemşirenize söyleyin.

Yararlı numaralar

GOSH santralı	020 7405 9200
Eczane Bölümü	020 7829 8680
Eczane ilaçları bilgileri	020 7829 8608

Notlar

Eczane Bölümü tarafından Çocuk ve Aile Bilgi Grubu'nun işbirliğiyle derlenmiştir

Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust
Great Ormond Street
London WC1N 3JH

www.goshfamilies.nhs.uk www.childrenfirst.nhs.uk

