

معلق الديازوكسيد و الكلوروثيازيد: معلومات للعوائل

ينبغي قراءة ورقة المعلومات هذه بالاقتران مع أي نشرة معلومات للمريض مقدمة من قبل الشركة المصنعة .

هذه المعلومات تصف معلق الديازوكسيد و معلق الكلوروثيازيد والتي عادة ما توصف معا . وهو يفسر كيفية إعطاءها وبعض من آثارها الجانبية. كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع الأدوية لذلك طفلك لن يعاني بالضرورة كل الآثار الجانبية المذكورة. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، يرجى استشارة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي أو الاتصال بأحد أرقام الاتصال المذكورة على ورقة المعلومات.

ما هي ديازوكسيد و كلوروثيازيد؟

يستخدم ديازوكسيد لعلاج استمرار انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) الناجمة عن إنتاج الجسم الكثير من الأنسولين (فرط الأنسولين). يعمل عن طريق منع الإفراج عن الأنسولين من قبل الجسم .

كلوروثيازيد هو مدرر للبول، وهذا هو الدواء الذي يزيد من كمية البول التي تنتجها الكلى. يتم استخدامه في حالات إحتباس الكثير من السوائل في الجسم ، مما تسبب في الانتفاخ (وذمة) وخاصة حول العينين أو تؤثر على اليدين أو القدمين. يتم وصف كلوروثيازيد عادة جنباً إلى جنب مع ديازوكسيد كون هذا الدواء له اثر جانبي وهو احتباس السوائل.

كيف يتم إعطائهم؟

يتم إعطاء معلق الديازوكسيد عن طريق الفم مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. وعادة ما يعطى معلق الكلوروثيازيد مرتين في اليوم. للحصول على إرشادات حول كيفية إعطاء طفلك أدوية سائلة، يرجى قراءة ورقة المعلومات الخاصة بنا أو مشاهدة الفيديو بودكاست المتاحة على موقعنا

www.gosh.nhs.uk/gosh_families/information_sheets/medicines_liquid/medicines_liquid_families.html

معلق الديازوكسيد ومعلق الكلوروثيازيد ليست متاحة بسهولة من الصيدلية المحلية الخاصة بك. وكذلك غير متاحة في المملكة المتحدة. لذلك يجب استيرادها من الخارج من قبل شركة استيراد الأدوية المرخصة. وقد تستغرق إمدادات هذه الأدوية وقتاً أطول من المعتاد للحصول عليها، وعادة عدة أيام.

- حالياً، قسم الصيدلة في مستشفى جريت أورموند ستريت يحصل على معلق ديازوكسيد تحت اسم العلامة التجارية Proglycem®. التعبئة والتغليف تعطي قوة الدواء 50 ملغم من العنصر النشط في 1 مل من المعلق، وهذا ما يعادل 250 ملغم في 5 مل. كما أنه يحتوي على مواد حافظة ومواد تلوين والمنكهات والمحليات.
- يتم الحصول على معلق كلوروثيازيد تحت اسم العلامة التجارية Diuril®. قوة الدواء 250 ملغم من العنصر النشط في 5 مل من المعلق. كما أنه يحتوي على مواد حافظة ومواد تلوين والمنكهات والمحليات.

Document translated by	Khawla Zainy	Date translated	16/09/2017
------------------------	--------------	-----------------	------------

من يجب ألا يتناول هذه الأدوية؟

يجب على الأشخاص الذين لديهم الحالات التالية مناقشة تناول هذه الأدوية مع طبيبه.

- فرط الحساسية من ديازوكسيد، كلوروثيازيد أو أي من مكوناتها.
- حامل، يمكن أن تكون حاملا، في محاولة لتصبح حاملا أو الرضاعة الطبيعية.
- لديهم مشاكل في القلب أو الرئة، مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي، إبتسناق العقي، الضائقة التنفسية، تسرع تنفس عابر، والالتهاب الرئوي، الإنتان، الفتق الحجابي الخلفي أو أمراض القلب الخلقية.

ماهي الأعراض الجانبية ؟

ملاحظة: إذا ظهرت على طفلك أي علامات صعوبة في التنفس، مثل توسع فتحات الأنف، وحركات الصدر غير العادية، والتنفس السريع، وصعوبات التغذية أو زرقة لشفثيهم أو الجلد، يرجى مراجعة الطبيب أو أخذ طفلك إلى أقرب قسم أو مستشفى طوارئ (A&E).

إذا كان أي من الأعراض الجانبية الموضحة أدناه شديدة أو تستمر لفترة طويلة، يرجى إخبار طبيبك .

ديازوكسيد

- فقدان الشهية والغثيان والقيء
- مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم، إحتباس الأملاح والسوائل، انتفاخ (وذمة)
- ارتفاع مستويات السكر في الدم
- ضغط دم منخفض
- عدم انتظام أو سرعة معدل ضربات القلب
- زيادة نمو الشعر

كلوروثيازيد

- ضعف وانخفاض ضغط الدم
- اضطراب خفيف في المعدة
- تغيرات في تعداد كريات الدم

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

بعض الأدوية يمكن أن تتفاعل مع ديازوكسيد و / أو الكلوروثيازيد، وتغير كيفية ومدى عملهم. راجع دائما طبيبك أو الصيدلي قبل إعطاء طفلك أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية العشبية أو التكميلية. ومن المعروف التالية تتفاعل مع ديازوكسيد و / أو كلوروثيازيد لذلك سوف تتطلب مراقبة دقيقة ومنتظمة لطفلك.

ديازوكسيد

- الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك مثبطات إيس، أنجيوتنسين II مستقبلات غونيسيس، حاصرات بيتا، حاصرات قنوات الكالسيوم وبعض مدررات البول

Document translated by	Khawla Zainy	Date translated	16/09/2017
------------------------	--------------	-----------------	------------

- كحول
- مضادات الاكتئاب
- مضادات الصرع بما في ذلك الفينيتوين
- مضادات الذهان

كلوروثيازيد

- الأدوية المضادة للسكري
- الأدوية الخافضة للضغط العالي على النحو الوارد أعلاه
- الكولسترامين وكوليستيبيول الراتنجات
- الستيرويدات القشرية
- ليثيوم
- غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)

معلومات مهمة

- احفظ الأ دوية في مكان آمن لا يستطيع الأطفال الوصول إليه.
- الحفاظ على المعلق في درجة حرارة الغرفة، بعيدا عن الضوء الساطع أو أشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن الحرارة. لا تخزن في الثلاجة.
- إذا كنت قد نسيت أن تعطي طفلك جرعة ولا تزال في غضون ساعات قليلة من موعد استحقاق الجرعة . قم بإعطاءها حالما تتذكر. خلاف ذلك، لا تعطي هذه الجرعة ولكن تأكد من إعطاء الجرعة التالية في موعدها. لا تعطي جرعة مضاعفة.
- إذا تقيأ طفلك مباشرة بعد تناول الجرعة يجب إبلاغ الطبيب المحلي أو الممرضة المحلية، لأنه قد يحتاج طفلك إلى أخذ جرعة أخرى.
- إذا قرر طبيبك أن يتوقف طفلك عن تناول هذه الأدوية أو أنها تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية يجب إرجاع أي أدوية متبقية إلى الصيدلي. لا تقم بتدققها في المراض أو رميها.

أرقام إتصال مفيدة

- بدالة الرئيسية لمستشفى جريت أورموند ستريت : 02074059200
- صيدلية معلومات الأدوية (من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء): 02078298608
- الممرضة المتخصصة بالغدد الصماء: تحويلة داخلية 0360 أو بليب 1016

Document translated by	Khawla Zainy	Date translated	16/09/2017
------------------------	--------------	-----------------	------------